

## **GUIDELINES DE DRAGAGEM**

## Consulta de 14 países:

- 1. Brasil
- 2. Canadá
- 3. Bélgica: valores para compostos orgânicos no COT
- 4. Dinamarca
- 5. Finlândia
- 6. França
- 7. Holanda
- 8. Irlanda
- 9. Noruega: 3 categorias
- 10. Portugal: 5 categorias
- 11. Reino Unido
- 12. Austrália: 1 nível de ação
- 13. Alemanha: valores para metais na fração < 20μm
- 14. Espanha: valores para metais na fração < 63µm




## **METAIS e ARSÊNIO**

Para incluir Alemanha e Espanha na avaliação, assumiu-se:

Fração < 20 μm: 20% Fração < 63 μm: 40%


Parâmetros	Alemanha		Alemanha		Espanha		Espanha	
	Nível 1	Nível 2	Nível 1	Nível 2	Nível 1	Nível 2	Nível 1	Nível 2
Metais e arsênio, em mg/Kg			Exemplo de argila 20%				Exemplo de lama 40%	
FRAÇÃO	<20 μm				< 63 μm			
Arsênio Total	30	150	6	30	80	200	32	80
Cádmio total	2,5	12,5	0,5	2,5	1	5	0,4	2
Cromo Total	150	750	30	150	200	1000	80	400
Chumbo total	100	500	20	100	120	600	48	240
Cobre Total	40	200	8	40	100	400	40	160
Mercúrio Total	1	5	0,20	1	0,6	3	0,24	1,2
Níquel Total	50	250	10	50	100	400	40	160
Zinco Total	350	1750	70	350	500	3000	200	1200






N1: restritivo N2: similar ao dos demais países











N1 e N2: similar ao dos demais países






N1 e N2: similar ao dos demais países






N1 e N2: similar ao dos demais países









N1 e N2: mais restritivo




## **PCB**


No Brasil não há definição do que são PCBs totais Há 209 tipos de bifenilas Maioria dos países: considera a soma dos 7 marcadores

PCB 28	
PCB 52	
PCB 101	
PCB 118	
PCB 138	
PCB 153	
PCB 180	











Sugestão: cabe ao órgão ambiental licenciador a definição das substâncias químicas aplicáveis





Individuais: Grupo A mais restritivo para Canadá e Finlândia





Brasil e Canadá: únicos que incluem 2-metilnaftaleno Não está na lista dos HPA prioritários



